

サクランボ特報

No. 4

令和8年5月15日
 JA中野市園芸課
 JA中野市サクランボ部会

生育は平年より1日程進んでいます。生育の早い地域、品種により結実が判明してきました。結実状況を良く確認し、摘果を進めて下さい。また、次年度の花芽充実のため新梢管理を実施し、樹冠内の明るさを確保して下さい。

収穫開始期は「香夏錦・高砂」が6月1日～5日頃、「佐藤錦」が6月3日～8日頃と予想されます。定期防除・管理作業は遅れないよう計画的に実施しましょう。

第5回 定期散布（高砂、佐藤錦等の最終防除）

灰星病、炭そ病、黒斑病、褐色せん孔病、オウトウショウジョウバエ、ハマキムシ類

散布時期	・ 5月21日～5月25日ごろ （第4回定期散布から14日後）	
散布薬剤	水 100ℓ当り	【定期散布】散布日 ____月 ____日(____)
	オンリーワンフロアブル 50mℓ (前日、3回) ディアナWDG 10g (前日、2回)	散布量 _____ ℓ
散布量	500ℓ / 10a	

第6回 定期散布（紅秀峰、紅きらり等の最終防除）

灰星病、炭そ病、黒斑病、褐色せん孔病、幼果菌核病、（ショウジョウバエ類）、カメムシ類、ハダニ類

散布時期	・ 6月4日～6月8日 （第5回定期散布から14日後）	
散布薬剤	水 100ℓ当り	【定期散布】散布日 ____月 ____日(____)
	ナリアWDG 50g (前日、3回) テルスターフロアブル 33mℓ (前日、2回)	散布量 _____ ℓ
散布量	500ℓ / 10a	
注意事項	ナリアWDGは、ぶどう（ピオーネ）、洋なし（ル・レクチェ）等に薬害が生じるので、飛散しないようにする。	

裏面も必ずご覧ください

●着色管理

(1) 摘芯・誘引を実施して、下垂している結果枝は支柱や枝つりをする

(2) 葉摘み

- ・収穫予定の7～10日前頃から行い、果実に直接覆いかぶさる葉を摘み取る
- ・摘み取る葉数は、果そう葉の3分の1程度を限度に、できるだけ少なめにとどめる。

⇒肥大に影響

(3) 葉上げ（雨よけハウスで実施）

葉摘みには限界があるので、輪ゴム・テープナー等で葉を束ねる

(4) 反射マルチ

- ・着色始め頃から設置する
- ・高温対策として、白色マルチは「タイベック」「パールライトWS」等を使用する
- ・着色を得られた部分は、マルチを早めに除去する

●その他

- ・雨よけハウスの被覆 ⇒ 5月15日～17日頃

高温による着色不良やウルミ果の発生を防ぐため、晴天時は天窓・サイドビニールを開ける

次回特報発行予定日：6月3日

問合せ先：園芸課・担当 畑（080-6325-1639）